

LES BONS GESTES

à adopter lors de la découverte d'un jeune oiseau

pour éviter les ramassages non nécessaires



NE PAS SE PRÉCIPITER ET SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Les oisillons ne sont jamais abandonnés par les parents !

Est-il blessé ?

Le jeune présente des signes
apparents de blessure
(plaie, sang, ailes pendante, fracture,...)



**EMMENEZ-LE AU
PLUS VITE AU CENTRE
DE SAUVEGARDE !**

Le jeune ne présente
aucun signe de blessure



EXCEPTIONS !
Effraie des clochers,
hirondelle et martinet

**Il peut être
replacé selon un
protocole propre
à son espèce et
à son stade de
développement**

LES BONS GESTES

à adopter lors de la découverte d'un jeune oiseau

pour éviter les ramassages non nécessaires



Replacer un oisillon non blessé trouvé au sol

Le jeune ne présente aucun signe de blessure et peut être remplacé selon un protocole propre à son espèce et à son stade de développement

**IL EST BIEN
PLUMÉ ET VOLÈTE**

Il n'est plus très loin de son envol

OU

**C'EST UN RAPACE
NOCTURNE**

**Remplacez-le
sur une branche**



C'EST UN OISILLON «TOUT-NU»

À peine sorti de l'œuf ou avec peu de plumes,
les yeux fermés et ne tenant pas debout

**Nid non visible
ou inaccessible**

**Emmenez-le
au plus vite au
Centre de
Sauvegarde !**

**Nid visible et
accessible**

**Remplacez-le
au nid**

Quelle que
soit l'espèce



**IL EST BIEN PLUMÉ MAIS NE
VOLÈTE PAS ENCORE**

**Nid non visible
ou inaccessible**

**Remplacez-le
dans un
contenant
suspendu**

selon un
protocole propre
à son espèce

LES BONS GESTES

à adopter lors de la découverte d'un jeune oiseau

pour éviter les ramassages non nécessaires



Replacer un oisillon bien plumé, non blessé, ne voletant pas encore, dans un contenant suspendu

QUELLE QUE SOIT
L'ESPÈCE*



Accrochez un carton ouvert et tapissé de papier journal, en hauteur (contre un arbre ou suspendu)

**sauf rapaces nocturnes : à replacer sur une branche*

MERLE OU
GRIVE



Suspendez une caisse de transport pour chat

PETIT PASSEREAU
(MÉSANGE, ROUGEGORGE,...)



Suspendez une cage à hamster/souris



Protocole de remplacement à utiliser dans votre jardin uniquement



Entre 1m50 et 3m du sol



Dans un rayon de 20 m du lieu de découverte



Ne nourrissez pas, les parents viendront nourrir l'oisillon
Sinon → Centre de Sauvegarde



Attention à la météo (Pluie = noyade / Canicule = déshydratation)



Pensez à libérer l'oiseau quand il sera capable de voler (d'ici 7 à 10 jours)

LES BONS GESTES

à adopter lors de la découverte d'un jeune oiseau

pour éviter les ramassages non nécessaires



UN DOUTE ?

BESOIN DE CONSEILS ?



Les parents viennent-ils bien nourrir l'oisillon ? Que dois-je faire si ce n'est pas le cas ? Comment bien préparer et installer le contenant suspendu ? ...



Toutes les réponses à ces questions et les clés pour bien réagir sont disponibles sur :

**[auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
sos-biodiversite/faune-en-detresse/](http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/sos-biodiversite/faune-en-detresse/)**



**Centre de Sauvegarde pour Oiseaux
en détresse en Auvergne**



2 rue de la Gantière, 63000 Clermont-Ferrand



Ouvert 7j/7, y compris les jours fériés



En dehors des horaires, des casiers sont à votre disposition devant le bâtiment pour déposer les oiseaux.



Centre de
sauvegarde
Auvergne